

AMINOSOIL PLUS

IDROLIZZATO PROTEICO CONSIGLIATO
PER APPLICAZIONI IN FERTIRRIGAZIONE

IDROLIZZATO
PROTEICO



**CONSENTITO
IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA**

CONFEZIONI
Taniche da 6 kg
(cartoni da 4 pz)
Taniche da 25 kg

- PROMUOVE LA CRESCITA DELLE PIANTE
- MIGLIORA L'ARCHITETTURA RADICALE
- COMBATTE LA STANCHEZZA DEL TERRENO
- PREDISPONE LE PIANTE AD UN MAGGIOR ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI

FORMULAZIONE
Liquido

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	6,5%
Azoto (N) organico solubile in acqua	6,5%
Carbonio (C) organico di origine biologica.....	23%

MATERIE PRIME

Carniccio

AVVERTENZE

Omogeneizzare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
Conservare a temperatura compresa tra 10°C e 30°C.
Il prodotto, non essendo pericoloso, non necessita di particolari precauzioni durante la manipolazione.

CARATTERISTICHE

Oltre all'apporto di azoto organico, incrementa i livelli di prolina, potente antistress endogeno. Particolarmente indicato per prevenire gelate tardive o periodi climatici avversi. AMINOSOIL PLUS, applicato in fertirrigazione, oltre ad essere assorbito direttamente, velocemente ed efficacemente dalle radici, consente di influire sul contenuto di sostanza organica presente e quindi di migliorare la fertilità globale del terreno. AMINOSOIL PLUS applicato in fertirrigazione migliora pertanto:

- l'efficienza di assorbimento dei nutrienti forniti con la concimazione attraverso la stimolazione dell'attività microbica;
- l'attività di diversi enzimi del suolo;
- l'incremento della produzione di ormoni e/o di regolatori di crescita delle piante.

APPLICAZIONE SU ORTICOLE, FLORICOLE E FRAGOLE



EPOCA INTERVENTO

Per tutto il periodo vegetativo 3÷5 kg/1000 m²

L'elevato contenuto aminoacidico di AMINOSOIL PLUS, con esclusivi rapporti fra prolina, idrossiprolina e glicina, è fondamentale per risolvere i principali stress e per l'attività chelante.

DOSI E MODALITÀ D'USO

Colture Orticole, Floricole, Fragole

3-5 kg/1000 m² *applicazione radicale*
I migliori risultati si ottengono impiegando Aminosoil Plus con interventi ripetuti ogni 10-15 giorni iniziando fin dalle prime fasi di sviluppo delle colture.

Colture Arboree

(Olio, Agrumi, Pesco, Ciliegio, Melo, Pero, Actinidia, ecc.)
15-20 kg/ha *applicazione radicale*
I migliori risultati si ottengono impiegando Aminosoil Plus con interventi ripetuti ogni 10-15 giorni iniziando fin dalle prime fasi di sviluppo delle colture.

